Tonalités musicales

Par Jean-Michel Bernard
Publié le 1 décembre 2025

Mots-clés : Musique, Mathématiques, Physique
Type : Article

Résumé du contenu de la présentation de deux tonalités musicales et de leurs propriétés.

Introduction

Dans cet article, nous présentons deux tonalités musicales et leurs propriétés.

La transposition de l'octave : bases physiques

Transposition

Le son pur est une sinusoïde définie par son amplitude A et sa fréquence f (en Hz). Sa période est $T = 1/f$ et sa pulsation $\omega = 2\pi f$. Le signal s'écrit :

$$s(t) = A\sin(2\pi f t + \varphi)$$

où φ est la phase à l'origine. Deux sons purs de fréquences f_1 et f_2 sont dits en rapport d'octave lorsque $f_2 = 2f_1$ ou $f_1 = 2f_2$. Plus généralement, deux fréquences sont en rapport d'octave si leur rapport est une puissance de 2 : $f_2/f_1 = 2^n$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Cette relation définit une classe d'équivalence sur l'ensemble des fréquences audibles.

Gamme

Une gamme est un ensemble fini de fréquences $\{f_0, f_1, \dots, f_{N-1}\}$ contenu dans un intervalle d'octave $[f_0, 2f_0[$, ordonné par fréquence croissante. Le nombre N de notes est appelé cardinal de la gamme. Le rapport entre deux fréquences consécutives est constant et vaut $r = 2^{1/N}$, de sorte que $f_{k+1} = r\,f_k$ et $f_N = 2f_0$.

Les douze notes du dodécaphonisme

Définition

Le dodécaphonisme est une technique de composition musicale fondée sur l'utilisation systématique des douze sons de la gamme chromatique tempérée, sans hiérarchie entre eux. Il a été développé par Arnold Schönberg au début du XX^{e} siècle. Contrairement à la tonalité, aucune note n'est privilégiée : chacune doit être entendue avant qu'une autre ne soit répétée.

Série dodécaphonique

Une série dodécaphonique est une permutation σ de l'ensemble $\{0, 1, \dots, 11\}$ représentant les douze classes de hauteur. Les opérations fondamentales sont :

- la transposition T_n : $T_n(\sigma)(k) = \sigma(k) + n \pmod{12}$;
- l'inversion I : $I(\sigma)(k) = -\sigma(k) \pmod{12}$;
- le rétrograde R : $R(\sigma)(k) = \sigma(11-k)$.

Le groupe engendré par T et I est isomorphe au groupe diédral D_{12} d'ordre 24.

Figure 1 – La série fondamentale et ses transformations.

Exemple

Considérons la série $\sigma = (0, 1, 4, 6, 7, 8, 11, 10, 9, 5, 3, 2)$. Sa transposition $T_5(\sigma)$ commence par $(5, 6, 9, 11, \dots)$, son inversion $I(\sigma)$ par $(0, 11, 8, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 7, 9, 10)$, et son rétrograde $R(\sigma)$ par $(2, 3, 5, 9, 10, 11, 8, 7, 6, 4, 1, 0)$.

Définition

Le cardinal d'un ensemble E est le nombre de ses éléments, noté $|E|$ ou $\#E$. Pour un ensemble fini, c'est un entier naturel.

Théorème

Le groupe engendré par T et I est d'ordre 24.

Démonstration

Soit $G = \langle T, I \rangle$. On a $T_n \circ T_m = T_{n+m}$ et $I \circ I = \mathrm{id}$, donc $I^{-1} = I$. Par ailleurs $I \circ T_n = T_{-n} \circ I$, ce qui montre que T est distingué dans G. Les T_n forment un sous-groupe cyclique d'ordre 12, et $I \notin \langle T \rangle$ car I est d'ordre 2 alors que les T_n non triviaux sont d'ordre 12. Ainsi $|G| = 24$.

Définition

Un groupe est dit cyclique s'il est engendré par un seul de ses éléments.

Théorème

Tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

Démonstration

Soit $H \subseteq \mathbb{Z}$ un sous-groupe non nul et $d = \min(H \cap \mathbb{N}^*)$. Pour tout $h \in H$, la division euclidienne donne $h = qd + r$ avec $0 \le r < d$. Comme $r = h - qd \in H$, la minimalité de d impose $r = 0$, donc $H = d\mathbb{Z}$.

Cycle tonal, type tonal

Cycle tonal sans tonique

Un tonnetz est un réseau triangulaire dont les sommets sont les douze classes de hauteur, chaque triangle représentant un accord parfait. Deux triangles partageant une arête correspondent à deux accords ayant deux notes communes.

- À tout cycle tonal fermé de n accords correspond un chemin fermé de longueur n dans le tonnetz.
- Le cycle des quintes fait un tour complet du tonnetz en 12 pas.



Figure 2 – Trois cycles tonals dans le tonnetz.

Définition

Un code-barres est une représentation graphique d'une information numérique sous la forme d'une succession de barres et d'espaces de largeurs variables, lisible par un scanner optique.

Théorème

Le cycle des quintes engendre l'ensemble des douze classes de hauteur.

Démonstration

Le cycle des quintes est la suite $(0, 7, 2, 9, 4, 11, 6, 1, 8, 3, 10, 5)$. Chaque terme s'obtient par addition de 7 modulo 12. Comme $\gcd(7, 12) = 1$, l'application $k \mapsto 7k \pmod{12}$ est une bijection de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, donc les douze termes sont tous distincts.

Définition

Le cardinal d'un ensemble E est le nombre de ses éléments, noté $|E|$ ou $\#E$. Pour un ensemble fini, c'est un entier naturel.

Théorème

Tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

Démonstration

Soit $H \subseteq \mathbb{Z}$ un sous-groupe non nul et $d = \min(H \cap \mathbb{N}^*)$. Pour tout $h \in H$, la division euclidienne donne $h = qd + r$ avec $0 \le r < d$. Comme $r = h - qd \in H$, la minimalité de d impose $r = 0$, donc $H = d\mathbb{Z}$.

Définition

Un groupe est dit cyclique s'il est engendré par un seul de ses éléments